

Information / Auffrischimpfung gegen COVID-19

Die STIKO (Ständige Impfkommission) hat zuletzt am 20.01.22 ihre Empfehlungen aktualisiert ([Epidemiologisches Bulletin 3/2022](#)).

In einer Pressemitteilung am 03.02.22 wird zusätzlich eine 2. Auffrischimpfung (= 4. Impfung) für besonders gesundheitlich gefährdete bzw. exponierte Personengruppen empfohlen:

Eine **Auffrischimpfung** gegen COVID-19 wird allen **Personen ab 12 Jahren (ab 5 Jahren bei Vorerkrankungen)** empfohlen mit einem **Mindestabstand von 3 Monaten** zur 2. Impfstoffdosis.

Für 12–17-Jährige ohne Vorerkrankungen wird ein eher längerer Abstand von bis zu 6 Monaten empfohlen.

Patienten mit **schwerer Immunschwäche** (z.B. angeborene/erworbene Immundefekte, Chemotherapie, Dialyse, Transplantation) sollte bereits **4 Wochen** nach erfolgter Grundimmunisierung eine Auffrischimpfung erfolgen.

Die Auffrischimpfung gegen COVID-19 soll **grundsätzlich mit einem mRNA-Impfstoff (BioNTech/Pfizer oder Moderna)** erfolgen.

Für **Personen < 30 Jahren** wird ausschließlich der Einsatz von **BioNTech/Pfizer** empfohlen.

Fand bereits die Grundimmunisierung mit einem mRNA-Impfstoff statt, sollte möglichst der gleiche Impfstoff verwendet werden. Wenn dieser nicht verfügbar ist, kann der jeweils andere mRNA-Impfstoff verabreicht werden.

2. Auffrischimpfung

Die STIKO empfiehlt **eine 2. Auffrischimpfung** für **gesundheitliche gefährdete Personengruppen** (Menschen ab 70 Jahren, BewohnerInnen und Betreute in Einrichtungen der Pflege, Menschen mit Immunschwäche ab 5 Jahren) sowie **Tätige in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen** (insbesondere bei direktem PatientInnen- und BewohnerInnenkontakt).

- Die 2. Auffrischimpfung soll bei **gesundheitlich gefährdeten Personengruppen** **frühestens 3 Monate nach der 1. Auffrischimpfung** mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen.
- Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen soll die 2. Auffrischimpfung frühestens nach 6 Monaten erhalten.

Johnson&Johnson/Janssen

Personen, die mit 1 Impfstoffdosis Johnson&Johnson/Janssen grundimmunisiert worden sind, sollen zur Optimierung ihres Impfschutzes eine **weitere Impfung mit einem mRNA-Impfstoff nach frühestens 4 Wochen** erhalten. **Anschließend nach mind. 3 Monaten** ebenfalls eine **Auffrischimpfung** erneut mit einem mRNA-Impfstoff.

Nach einer SARS-CoV-2-Infektion

Die STIKO empfiehlt in Ihrer Mitteilung vom 21.12.21 für immungesunde Personen ab 12 Jahren (ab 5 Jahren bei Vorerkrankungen), die eine gesicherte SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, die **Verabreichung einer Impfstoffdosis frühestens 3 Monate nach der Erkrankung**.

Antikörperbestimmung vor Impfung

Es ist nicht bekannt, ab welchem Wert von einem ausreichenden Schutz vor der Erkrankung ausgegangen werden kann. Es wird daher auch **nicht empfohlen**, vor der Verabreichung der (Auffrisch-)Impfung eine serologische Antikörpertestung durchzuführen.

Praxis Dr. Wagner (06.02.21)