

Bisher sind in Deutschland vier Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 bedingt zugelassen:

Die mRNA-Impfstoffe von **BioNTech/Pfizer** und **Moderna** sowie die Vektor-basierten Impfstoffe von **AstraZeneca** und **Johnson&Johnson/Janssen**.

Für die drei erstgenannten Impfstoffe sind **zwei intramuskuläre Injektionen** im Abstand von 3-6 Wochen (BioNTech/Pfizer), 4-6 Wochen (Moderna) oder 4-12 Wochen (AstraZeneca) vorgesehen. Für den Impfstoff von **Johnson&Johnson/Janssen** war bisher **eine Impfung** ausreichend (seit 07.10.21 soll eine weitere Impfung mit einem mRNA-Impfstoff nach frühestens 4 Wochen erfolgen)

Die STIKO (ständige Impfkommision) empfiehlt die Impfstoffe von **AstraZeneca** und **Johnson & Johnson** nur für **Personen ab 60 Jahren**. Für Personen, die die erste Impfung mit AstraZeneca erhalten haben, wird seit Anfang Juli die zweite Impfung mit einem mRNA-Impfstoff nach mindestens 4 Wochen empfohlen (heterologe Impfung).

Seit 16.08.21 empfiehlt die STIKO auch die **Impfung von Jugendlichen** zwischen 12 und 17 Jahren. Zuvor galt diese Empfehlung nur bei schweren Vorerkrankungen. Aktuell sind die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna für diese Altersgruppe bedingt zugelassen.

Ebenso wird die Impfung für **Schwangere ab dem 2. Trimenon** empfohlen.

Personen mit PCR-bestätigter **COVID-19 Erkrankung** wird eine **einmalige Impfung ab 4 Wochen nach Genesung** empfohlen.

Sollten Sie weitere Informationen wünschen, finden Sie [hier](#) Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ).

Praxis Dr. Wagner (07.10.21)